溫

熱

經

緯

也顧明於此者昧於彼聚訟紛紜各鳴已得徒使好學之 閱悉則亦婚之述耳。而初非有私心臆斷於其間的 **个述而不作之意而其中間以按語亦謂旁考他書來** 五英該博淹貫引經斥異衆美兼收謂前人之說

既已 工無所適從而或過信。一家之言未免偏之爲害矣王 一尤易混淆前賢所以各有專書互相闡發而斤斤於此 變化萬端不容或紊而傷寒中温熱暑溼之病證因 來生民之疾莫重於傷寒存亡判乎呼吸得失決於 何必再申已意因而棄瑕錄瑜、彙成温熱經緯一 AND ROYALES OF THE PARTY OF THE

民之命豈淺鮮哉屬爲弁言发不揣谫陋而書之言而四時五氣之感亦不致難辨而失之歧誤其有稗生於前復得王氏釐訂於後由是千秋絕業不致淆亂於羣不知醫過從之餘竊聞緒論。喜長沙之學旣得諸家表彰 成豐二年王子·初夏仁和趙婁齡。

載孟英遊江右時余握象宜黃始納交於孟英因得讀 撫案稱快數載以來、尺書往復魚鴈爲勞夫疾疾人之 春錄仁術志諸治案為之編纂排比付諸剞劂以惠 示拓我見聞而余毎有所疑。馳書相問難孟英爲之條 樓析援古證今如冰斯開如結斯解。披函莊誦未嘗 孟英知余耽情竹素積嗜成癖所獲奇方心籍恆郵寄 月也不有藥石。患害曷疹然而醫籍流傳。途徑多歧 亂論也在道光紀元之二

能償既而軍事與粵西賊起攻長沙屠武昌阳安慶遂時 浮訛言繁興張皇既虞生事優柔又恐養奸。昕夕鹿鹿簿 相充邀孟英共事揚權成斯盛舉浮沈數載而所志之莫 陵江西左皖右楚以大江爲門戸大憲議保甲議團練 恆欲廣搜百氏兼綜羣言吸攝精華。 固疆国時余自宜黃改任臨川雖地居腹裏而民氣素 一戈載途道路梗澀乃取道長沙泛洞庭涉江漢當 而此事遂不暇計及 好學深思之士而古 インドコーショ Ä 未幾先君子。在籍棄養奔喪 **/ 識譾陋不敢自信欲俟資** 碩吐糟粕勒

廬間里故人 而孟英業益精學益邃涵養深醇粹然見於面 一里、馳驅五閱月。而迄未得歸也。甲寅秋烽煙稍 未得深談惘惘而别已而孟英來答拜與夫 八半歸零落追念疇昔喟然與歎居數月復以 。猝與賊遇逐折而東族寓於豊甯之間蓋 一四九八四年十二)邱墓安先君子於窀穸。十年遊子。重返 $\Gamma_{\rm o}$ 因得調孟英於武林握手言軟懸敘

孟英數年。所搜輯言醫之書也。或表著前徽或獨攄心得 或採摭奇方。如肘後或區別品彙如圖經医坐篷窗間 環維誦,市情妙緒層見疊出滿紙靈光與嚴陵山色競秀 英懷才抱奇隱居不仕 所託命者。其精神必强固其志慮必專壹其學問必博洽 争奇噫技至此乎。夫士君子。能成不朽之盛業而爲斯民 《蘊蓄必深厚,而天又必假以寬閒之歲月。以成其志孟 寒蔣語家為綠體例 玉山遇贼。 门旁系用厂口 不能前。仍返武林就孟英居焉晨 而肆力於醫故所造如此豈偶然

識之精耶異日由此例而推之 **境為斯道集大成街** 丽盆詳。其言則前人之 項背而孟英謬引爲知己始所謂形骸之 耶因備逃顛末於簡端以誌交誼之雅云。 數年。莫能措手。孟英已奮筆而成此 一旦もしていないよう 支字蔓語羼雜其間是何古 言也而其意則非前一 各雑證が 、關榛蕪獨開異 八所及

乙琴軒岐可作,其鑑此心。

「一人妙術。可命、良箴不偏不易宜古宜今。干狐之裘百也其友。烏程汪日楨。讀而善之因爲之贊日 **俾學者。得所遵循。生平著述等身。當以此書稱首。** 同治。 一年。癸亥二月朔書於上海旅次 前上に日本に ī.

溼温有熱病有温病此五氣感人古人皆謂之傷寒故は偏卽人氣有未和也難經云傷寒有五有中風有傷寒有 五氣原以化 晦或以 證治。與內經難經淵源 **冒論亦以傷寒統之而條分中風傷寒温病溼喝五** //·疫·或不知有伏氣爲病。或不 立城見之 自即先の至者とチョ 温熱或以温熱爲傷寒或併疫於 者昌後賢 人或感之為病者非天 轍。法雖未盡名巳備焉。陰符 見遂至議論愈多至 古人皆謂之 氣有 風温。 理

起惑而知所取舍矣非敢妄逞意見欲葢前賢用質通暑溼熱諸病名了然於胸中。然後博覽羣書應不爲其 爲剖論。兹雄不揣愚昧。以軒岐仲景之文爲經葉薛諸家 強荒陋。 從之間附管窺必加雄案二字以别之 辯爲緯纂爲温熱經緯五卷其中注釋譯昔賢之善者 併暑暍 字而不識。艮可慨巳我曾王父隨筆中。

|--|

方論	卷五	余師愚疫病篇	薛生白淫熱病篇	陳平伯外感温病篇	卷四	葉香巖三時伏氣外感篇	葉香嚴外感温熱篇	卷三	The state of the s
									,

素問生氣通天論日冬傷 寒雄張不按伸 熱經緯卷 口冬寒伏於少 ヨ山上に立ち手といっ 温煮為傷 嚴寒萬類深藏君 寒春必温病 烏程汪曰楨謝城評 定州楊照黎素園 仁和沈宗淦辛甫參 5 0

金匱眞言論日,夫精者身之本也故藏于精者。春不病温 章虛谷曰經論温病有內伏而發外者有外感隨時而 發泄。甚至桃李反花之類亦是也。 其精者。皆是即冬時天氣應寒而陽不潛藏如春日之 成者。其由內伏發外者。又有虛實二證。上 尤引吾日冬傷于寒者春月温病之由而冬不藏精者。 吳鞠通曰不藏精非專主房勞說。 叉冬時受寒之源也。 發者為實證 王啟元日。精氣伏藏則陽不妄升。故春無温病。 一切人事之能動搖 一條爲實證此

熟論篇曰凡病傷寒而成温者先夏至日者爲病温發 熱大盛故日暑。 日者為病暑暑當與汗出勿止 楊上善日冬傷于寒輕者。夏至以前發爲温病重 林觀子口少陰眞氣旣虧邪必深了 王啟元日此以熱之微甚爲義也陽熱未盛故日 條爲虛證也 (後發為暑病 且先四章完一

六月節。日· 章虚谷曰此言凡病傷寒則不獨指冬時之寒也蓋寒 書武帝紀云夏大旱民多喝死故暑也熱也喝也皆 肺者乃外感温邪若夏至後則漸熱故病發名曰暑蓋 熱之漸也然夏未至則不熱故病發猶曰温其首先犯 雄按脈要精微論曰彼春之暖爲夏之暑。夫暖即温 相對待是病暑即病熱也乃仲聖以夏月外感熱病名 邪化熱隨時皆有也。 日喝者别於伏氣之熱病而言也說文云喝傷暑也漢 日傷寒有五熱病乃其 「小暑八月中。日大暑與冬至後之小寒大寒 (13) より より と) 耳。餘論俱散失矣。

則庚辛日死刺足厥陰小 言及驚腦滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙 熱之輕者也熱温之重者也故古人 **吳**翰通日 肝病則失其疎洩之職故小便先黃也腹痛多 ド

「 氣之名也後 辨也其實與病情無涉而於醫理反混淆也。 一肝熱病者。小便先黃腹痛名 自血狀形式并分 ·便先黃者肝脈絡陰器。又肝士 〉陽其逆則頭痛員員 人往往互稱。 大汗。氣逝

刺者病在 厥陰心包病也兩厥陰同氣熱爭則手厥陰亦病也脇 木改甚。甲乙 尅 順其可愈之 肝主風風淫四末又 少陰腎中眞陰陰傷故騷擾 脾 痛。肝脈行身之兩旁。脇其要路也 的表系系 然争。邪熱盛 兼潟其腑也逆則頭痛以下肝 理战逢其不勝之日而死也厥陰少陽並 一肝木旺時。故汗出 **水病尅**+ 不得安臥也庚辛金日 旃主 而愈氣逆謂病重而 之理餘臟 版木病熱必吸 彷此。 小得安臥 不起

太陽 主火故煩膻中氣不舒故悶嘔肝病也木火同氣熱甚。 **吳鞠通** 事經謂膻中為臣使之官喜樂出焉。心病故不樂也卒 心痛、凡實痛。皆邪正 章虛谷曰。人身生陽之氣根於腎臟始發於肝木。木生 赤。火色也無汗。汗爲心液。熱閉液乾,汗不得通也。 而肝病亦見也且邪居膈上多善嘔也頭痛火升也面 **一流于癸甚。**丙丁大汗。氣逆則王癸死,刺手小 口心病先不樂者。心包名膻中。居心下。代君用 温热亚草化 金金生水水叉生木。如是生生不息則 相爭熱爭故卒然心痛也煩悶心 山山

熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身 定之中。自有一定之理。足以印證難經仲景之言而 序。首列肝、次以心脾肺腎以明邪隨生氣而動其於 岐越人仲景之 陰經或發於陽經正合難經之言也今內經按生氣之 則病發然其發也隨氣所注而無定處故難經言温病 脈行在諸經不知何經之動也如仲景所論或發於 仰腹滿 患也邪伏血氣之中。必隨生陽之氣 脈相承更可見矣。 是戊巳大汗。氣逆則 7熱熱爭則腰 而動動

一年 インドー

欬痛走 治陽明主 滿泄脾經太 青欲嘔亦木病也腰痛不可用俯仰 心也 氣逆則丙丁死刺手 胸膺背不得太息頭痛 裏故脾病頭先重也類心 本病額痛亦木病也的東面利機關故痛而至於不可俯仰也腹 淅然厥起毫毛惡風寒舌上 病而木病亦見也煩心脾脈注心也 **太陰陽明出血** 陽部也土之與大 而寒丙

熱病者先腰痛胻疫苦渴數 開汗出其熱暫 痛 鬱極故痛也。走者不 氣膹變不 火尅金也胸膺 小堪亦天氣膹鬱熱不得泄直 熱不欲言其逆則項痛 病先惡風寒者肺 杆衛皮毛也 17:13:14:17 泄則寒也尊悉 非內 小定之 皆天氣 六古 氣叉士 者肺氣不化則溼 陰太陽。 **公息熱閉肺臓也** 心肺主天 毛肺 鬱熱而 入氣肺氣 病

腎脈從小指之下。衰趨足心涌泉穴病甚而熱也不欲 **陽之脈從顛入** 於督之長强力 甚而移之腑。故項痛而强也胻寒熱極爲寒也足下 而惡燥病熱。則液傷而燥故苦渴而飲水水救也項 下貫腨內腨。卽胻也<u>痠熱</u>鑠液也苦渴數飲腎主五 言有無可奈何之苦也邪氣上逆則項更痛員員澹 者左頰先赤心熱病者類先去 不能自主 全世上の日本日から 難以形狀之病也尊悉 、絡膼還出別項下腎病至於熱爭臟 銀中。以上 ; (陽之脈

者,刺之名曰治未病 中。隨氣血流行而 章虚谷日。此更詳五臟熱邪未發而必先見於色之 辨也左頰顏鼻。右頰頤是肝心脾肺腎臟之 之 所在而取之者是爲上丁 而先見色於面良工望而知其邪動之處乘其始動 行在諸經不知何經之動也故其發也必隨生氣而動 部位也病雖未發其色先見可見邪本伏於氣血之 便邪勢殺而病自輕即難經所云隨其經之 · 頰先赤腎熱病者.頤先去 未永れ 不覺更可印證難經所云温病之 治未病也用藥 氣應於面 可

身寒熱除而後止。 章虛谷日以其久伏之邪熱從內發故治之必先飲寒 雄按。今人不讀內經雖温熱暑疫諸病。 禁其凉飲厚其衣被閉其百 愈後手指足縫出水速投米仁三兩茯苓三兩白朮 然飲冷。亦須有節過度則有停飲腫滿嘔利等患更有 水從裏逐熱然後刺之從外而泄再衣以寒居處以寒 以以飲之寒水乃刺之必寒衣之居此寒處身 温光江年之一 **广牖因而致殆者我見實多** 概治同傷寒

太陽之脈。色榮顴骨。熱病也榮未夜日今且得汗。待時 與厥陰脈爭見者死期不過三 於死此則外感先發伏邪後發者可生若同發則死期 冷雖多而汗出亦多。必無後思 腳趾脫落此即諺所謂脫腳傷寒也亦不可不 不過三日也云太陽之脈者邪受太陽經脈即一 兩車前五兩桂心。一錢名驅溼保脫湯連 頭項痛腰脊强者是也色榮額骨者鮮榮色力 一有異彼則內外。同時受邪內外俱病故不免 インディー 明外感與伏邪互病之證也與熱論篇之 一日,其熱病內連腎。 M

熱內發其勢必與太陽外邪連合而不可解故此之 未病亦可也倘與厥陰經脈病證爭見則腎肝皆有邪 是也其內伏之 士癸日。得大汗而

已也

又如所云見

赤色者

刺之名治 相交今且使其得汗。先解外邪所謂未滿三日可汗之 巳者言太陽經脈外受之邪與榮血中。伏熱之邪。尚未 邪已動。循榮血見色於顴也榮未交今且得汗。待時而 見於顴骨也蓋顴者。骨之本。骨者腎所生腎臟伏熱 口方死。此則其熱病。內連腎臟本元即絶故至 温此四章花 **不過三** 一邪後發待臟氣旺時可已如腎熱疯待 一日也蓋兩感病起於經必待胃

已與少陰脈爭見者死期不過三日。 少陽之 章虚谷日上言肝熱病者左類先赤肝爲厥陰膽爲 樂於煩前若外內之邪尚未相交今且使其得汗以解 過三日也大抵外內之 陽相表裏者也外邪受於少陽經脈而肝臟伏熱之 證爭見則肝連腎熱而內外邪勢必交合難解死期 外,其內發之熱可待臟氣旺時而已若與少陰經脈 救故要緊在榮未交一句下文病名陰陽交亦即樂日 脈色樂頰前熱病也樂未交日。今且得汗。待時 1121411111 邪發有先後而不交合。何可解

評熱病篇帝日有病温者汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗 **技狂言。不能食病名為何岐伯曰名陰陽交交者死也** 葉香嚴曰。交者。陰液外泄陽邪內陷也。 陰陽齊病而非陰陽交病也。 非同太陽少陽厥陰其邪連合而無出路則必死也。 烟者余竊度之以陽明之腑可用攻瀉之法不至必死 不得通故日夜者死也郭氏謂即是兩感病然兩感是 **交之義也經文止舉太陽少陽兩證不及陽明太陰合** 一可復理攻其陰則陽扞之不得入。攻其陽則陰持之 批吾日。交非交通之謂乃錯亂之謂也陰陽錯亂而 省四北四省公

也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且 人之所以汗出者。皆生於穀穀生於精。今邪氣交爭於骨 內而得汗者是邪卻而精勝也精勝則當能食而不復熱。 一熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱是邪勝 病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不 也下文明其所以然之理。 章虛谷只陰陽之氣本來相交而相生者今因邪勢彌 漫外感陽分之邪與內發陰分之邪交合爲一。而本元 正氣絶矣。故病名陰陽交。交者死,非陰陽正氣之相交 汗出而脈佝躁盛者死今脈不與汗相應此不勝 111日日本大学の日本

章虚各日汗生於穀穀生 **輒復熱是精卻而邪勝也所以不能食精無俾也俾者** 熱者。邪氣未去也其所出之汗。精氣徒泄也故汗出 穀以生津液發而爲汗。邪隨汗泄則邪卻而精勝也精 精氣存脈必靜矣。今脈與汗不相應則精氣不勝邪氣 出而脈躁盛者。死正謂其精卻。而邪不去也若邪去而 倚藉之謂其病雖留連其壽可立待而傾也古論云汗 氣勝則當能食以化水穀其邪已泄則不復熱矣乃 也其死明矣。且狂言是失志失志者死。一也汗出復 生雖愈必死也 **企业共享工程工程** 於精者謂由本元精氣化水

而驚鐘鼓不爲動聞木音而驚何也岐伯曰陽明者胃脈 汪按此條為温證不可妄表之訓夢隱一 雄按。温證誤作傷寒治而妄發其汗。多有此候。 不煩蓋温病誤表縱不成死候亦必不易愈矣麻黄柱 生證雖似愈必死也。 八種膽餒最誤人者、陶節庵之柴葛解肌湯也 一也故聞木音而驚者。土惡木也帝日其惡水 くとしているかられる人 一也汗與脈不相應三也今見三死證人 足熡明之 肉其脈血氣盛邪客之 之脈病.惡人 八與火聞木音則惕 語可謂要言

处連經則生。 章處合日邪結在腑則氣阻而喘不能循經達於四 外出則連經故生。 而又厥逆蓋四肢禀氣於脾胃也邪內, 寒反惡熱也邪結而氣厥逆則喘而惋惋者懊慢故惡 乙音屬金土故不爲動也。熱甚故惡火仲景所云不惡 口或喘而死者。或喘而生者何也岐伯口 仙。 祖北平年 一被邪因更畏木克故聞木育而驚也 何也岐伯日 陽明厥則喘而惋惋則惡 人則連 山峽道

屈所上之處皆非其素所能也而反能者何也岐伯日四 <u>六安言罵詈。不避親疏而不欲食不欲食故妄走也。</u> 衣而走者何也岐伯日熱盛於身故藥衣欲走也帝日 者。諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也帝日其 走也是大承氣湯之證其邪連經脈必滑大下之可生 衝動故妄言罵詈胃中邪實不欲飲食四肢多力則妄 章虚谷日四肢禀氣於脾胃胃爲臟腑之海而陽明行 肢則能登高也熱盛於臭故藥衣欲走邪飢神明怒氣 氣於三陽故四肢爲諸陽之本也邪盛於胃氣質於四 院甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣

虎湯者。沈細之脈亦有因熱邪閉塞使然形證實者。 其邪連臟脈必沈細仲景三 而脈加數者爲虛也。 之可生未可概以陰脈見而斷其必死凡熱邪壅遏脈 雄按温證誤投熱藥補劑亦有此候經證亦有可用白 下證不可用下法矣。 則尙有可生之機未必盡生澀則斷無不死者也余所 汪按大承氣證,中聖謂脈弦者生澀者死洞溪則云弦 多細耎遲澀按證清解。自形滑數不此內傷病服涼藥 人者。固下之不必顧忌亦有弦而兼澀下 THE REPORT SHIP AND A 7 7 The second second second

|刺志論| **安而面若火鉄也喘喝者火尅金故喘遏鬱朐中。** 大從真謂心氣不喘喝者。火尅金故喘遏鬱朐中。 風故欲喝 主言暑邪在心雖靜。亦欲自言不休也淵意 氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑 淋漓者可用白虎也 伸之。其或邪不外張而內藏於 火邪與心同氣心受邪迫汗出而煩 寒似 從煩

雄按。 非 爲內經兩上 淦按。云得之 非也。 以治寒 則從四序說喻氏於內經中。又補 「地熱、叉」云、陰陽之 法。治温暑哉 **大綱。是從對待說若春傷 週而水諸遠遂** が密律を 傷亦如水火之不 * 兼火病 也者、有 升降寒暑彰其兆理極明 於風夏 相別和 **豫泄云** 天寒

而强食之 傷寒藥治之而 視其虛實調其逆從 熱病已愈時 因食復勞復女勞復。而發汗必 ーギーオンハン 「病熱少愈食肉則復多食 故有所遺山若 愈餘熱留藏於經 有所遺 有温暑燥溼之病。陋矣 此者皆病已衰而熱有 以巴也帝! 何也岐伯曰 -亡陽而 達 何

病且出也。 調養也。 疾診尺篇日尺盾 經文蒙混成章由未細心紬釋也尺層熱甚火鑠精 悉以傷寒。足三陰經温法治之哉張會卿。作類經割裂 吳鞠通日經之辨温病分明如是何世 脈盛躁精被火煎沸也脈盛而滑邪機向外也o此節 食穀則邪遺留必淹纏難愈故當戒口清淡稀粥漸爲 **/ 氣象論日。人一呼。脈三動。** 下。診温病之法。 回此四年 熟甚脈盛躁者病温也其脈盛而滑

液尺之 之。尺爲陰故不熱也。如脈動躁。而兼澀是 若尺部肌膚熱則爲病温蓋温病必傷金水一臟之 温其不熱而脈兼滑者則為病風風之 吳鞠通曰。呼吸俱三動是六七 病則為痺矣。 脈屬腎尺之 熱脈滑。日病 沿著系术分 穴屬肺也此處肌肉熱故知為 三重脈矣

補陰之 吳鞠通日人 綱蓋熱病未有不耗陰者其耗之未盡則生盡則陽 潟陽則陰得安 陽氣通則汗隨之實 口實其陰以補其不足此 不足。故日 正生では手に 《其位。故: 躁邪在 真能體味斯言思過 然下雨亦曷濟若程盡而陰竭 焦故取之 亦曷濟耶 句實 道亦如此之 鴻陽之 治温熱之喫緊 足者陽盛則陰衰 11.1 有餘即所

指間。 熱病。七日。 泄所謂 身熱甚。陰陽皆靜者。勿刺也其可刺者。急取之不汗出則 Щ, 吳翰通日。陽證陰脈故日 吳鞠通 奈何恣用升提温燥重傷其津耶。 勿刺者有死徵也。 日喘爲肺氣實 八日。動喘而眩者。急刺之汗且自出 一熱痺開則汗出。大指間肺之 **州者溲血。口中乾。** ? 拉為風火鼓蕩故淺刺手上 少商品

告竭陰液不得上潮故口中乾脈至微小。不惟陰精 然間有可治者 吳鞠通日就不 陽氣亦從而竭矣死象自明。倘脈實者可治。 **吳翰通曰邪氣深**]得汗出而脈佝躁喘且復熱勿刺膚喘甚者死 不可治 不爲汗衰。金受火尅喘而化源欲絶故 小能自收了 下焦逼血從小 八與邪 四陰頗有寒者

熱病。 靜者生。 熱病者脈倘躁盛而不得汗者此陽脈之 吳鞠通日汗後脈躁陰虛之 以甘涼藥沃之得法亦有得生者。 有寒。熱邪深入陰分。外雖似寒。而熱在骨髓也故日 脱也不能自收了 小治其有陰精。未至涸竭者間可徼幸得生。潛參 已得汗。而脈佾躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈 正氣億也日 極成的 「乾熱甚陽邪獨盛也陰頗

流典 此 比 貴在留之得法耳。至陰陽俱靜。邪氣深 劑。急急救陰亦有活者即已得汗。而陽脈躁甚邪强 (可刺者有九。一口 嘰 死雖然 則呃呃而上逆也治以輕清 不死何待。 分津液便有 者。见忒也肺胃之 下焦陰分正 差此證循 分生理

語下利。 加楊 以挨 宜用 陽隘之 謂 下焦 一泄而腹滿甚者死 平。熱不 海有别也 升。病由冬 期腦與色合質刻 同見者不治若有 也故死又陳遠公云喘滿直視路 敖 兩。 **灬幾可挽** 證未見者或可望生 是邪尚踞而陰 察其脈亦必與 **广流也則其%必** 竹苑。 下脫

司老人 吳鞠通曰。目不明精散而氣脫也經日 **猶不已安得不死**。 雄按腹滿者宜泄之老人嬰兒了 汪按此目不明乃難經所謂脫陰者目盲也陰竭而 **氣脫者。目不明熱猶未已仍鑠其精而傷其氣不死得** 路老弱陰液不充之體涸可立待故日死。 人嬰兒熱而腹滿者死。 明熱不已者死 嘔下血者死。 一下的事情而不知一

吳賴通曰。陽邪深入則 血陰液兩奪是爲死徵 汪按此舌爛。乃由腎中虛陽故斷爲死候與肺胃熱熾 不得上濟故舌本爛熱退猶可生熱仍不 舌爛熱不已者死。 級汗 · 舌糜腐者大異 ~ 计新光系 不出出不至足者死 陰 陽之火結於血分腎水 死也

徴也。 刺爲刺則必死也然刺固不可亦有可藥而愈者盡刺 王深王於肝部也○此節歴敍熱病之死徴以禁人之 温要館。資刺法之所短而湯樂之所長也。 汪按統觀死候九條。大抵由於陰竭者爲多吳氏語破 雄按汗出不至足者肺氣不能下及亦是化源欲絶方 法能泄能通開熱邪之閉結最速至於益陰以存津。禄 **6轉通日髓熱者。邪人至深至於肾部也熱而痙邪7** 一體熱者死九日熱而痙者死腰北寒疫齒噤斷也 自山といびはまずんだ。」

	温熱經緯卷一					
--	--------	--	--	--	--	--

痺也病人云質咽中痛雖爾今復欲下利。 奇舊有伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷非 像寒論。師日·伏氣之病以意候之。今月之內、欲有伏氣假 張路玉日冬月感寒伏藏於經至春當發故日以意候 *****仲景伏氣温病篇 · 約稱卷 《温光如上年长二一 烏程汪日楨謝城評 定州楊照黎素園 錢塘顧 俊聽泉參 海甯王士

章虛谷日此條仲景教 之一个月之內言春分候也若 出也若脈微弱知其邪雖化熱未離少陰循經脈而 能外發勢必內攻其後下利也 熱必上升。故必喉中痛似傷腎司開闔陰邪之熱邪不 以心意測候之也如今月之丙。欲有發伏氣之叛者必 氣而發假令舊有伏氣者須審其脈知其邪從何處而 無其氣而有其病病與時氣不合即知其病因舊有份 必不發於陽而發於陰以少陰之脈循喉嚨伏邪始發 ハイラーオイター 為者卻非外邪人內之喉痺是內熱以 辨冬伏寒邪春發之温病當

得外散勢必又從下走故日實咽中痛雖爾今復欲下 知為內發之 在而取之是言温病。初由伏邪隨氣血流行在諸經 觀仲景標中風傷寒暑熱等病之脈與難經同惟難經 及其邪之發也不知從何經而動旣發之後各隨其邪 所在之經而治之。其發無定處故無一定之脈象可示 **言温病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經** 也然亦有兼外感者即審其脈證皆可照此辨之也 /当世代のでは年から、一 一伏熱是無其氣而有其病也伏熱上 一外證今脈微弱則非外感而反喉痛則確

陰病欲寐也 其邪未離少陰必當有咽痛下利等證正與難經互 無定證既無定證則無定脈故難經不標脈象也 發明者也故如下文三邪出三陽熱勢大盛其脈浮大 景與難經無異也 極場。 關上 其與外感之 上則是脈隨證變證隨脈見其發也旣無定處則 〈教人審脈以辨邪發之 邪而有定證定脈者迥不同矣 三日。咽痛者可與甘草湯 微弱即知

葉香嚴日春夏温熱之病必自內而及 治少陰伏氣發温之最急者蓋甘先 桔梗升載其邪使發於陽分之陰邪盡從陽分而散 功也設不差必是伏邪所發勢盛緩不足以濟急更加 致仍復下陷入於陰分也倘治稍失宜陰津爲熱邪所 之勢亦緩。且生用。力能瀉火故不兼别味獨用以取專 乃祛熱救陰之藥恐無及也。 《傷寒之邪。自太陽遞入一 少陰爲陰寒邪亦爲陰以陰遇陰故得藏 一年日本のないまた ハン・・・ 三陰温病之邪自小 入牌牌緩則陰 夕伏氣之病 按此專指 取以

外達 至少陰。温病之 温開泄之 陰傳出 虚谷 合用辛温開泄亦不 源流
故各條
次序亦 曰風寒外閉少 陽。 一法矣。此少陰伏熱內發循經 和中。導邪外達如 邪。自裏出表故先少陰而後 矣傷寒之 陰 2邪。自表入 示得外 藥以遏其外出之 **小差更加桔梗。上通** 出故痛通其氣使 人裏故先 太陽。 夏散 咽痛雖 勢故

陰病下利咽痛胸滿心煩者 邪之意比 實爲熱證邪熱充斤。上 金安任 張路玉日 可用矣又立豬屑湯以潤少陰之燥與用黑驢皮之 下利咽痛胸滿 用附子温經陰竭者用豬膚潤燥 **州皆自內而之** 乙思過半矣。 心中煩 E心煩少陰之伏邪雖發陰經 中間無所不到寒下 小知也

豬苓湯利小便而滋陰滋其陰 液消耗故以芩連祛熱膠芍滋陰兩得之矣。 一雖陰火不升。未見咽痛等證而心煩不得臥己知陰 インコンカンカンフ 如兼有停 **小得眠以心肺。皆通少陰之** 口欬而嘔渴。心煩不得眠者。豬女 外透故逆於肺則欬而嘔

腑。 張路玉日伏氣之發於少陰其勢最急與傷寒之傳經 熱證不同得病機一 少陰急下三證。 絕之腎水與陽明急下三法同源異派。 一。必枯槁難爲矣。故宜急下。以赦腎水之燔灼也。按 盡觀仲景隨證設方。辨别施治其義理精微有難一 一屬温熱發自少陰皆刻不容緩之證故當急救 同有如此者况又傳於他經而其變證殆上五條皆邪不離少陰其病之輕重變化 屬傳經熱邪亢極。一屬熱邪轉入 「燥咽乾者急下之宜大 三日即口燥咽乾延至五六日。始

寒者非温熱病矣温熱病而有惡風惡寒之證者重有 喻矣 風寒新中也 王安道日温病如此則知熱病亦如此是則了 感風温之氣而病者亦謂之温。維裝 郭白雲日冬傷於寒至春發爲温病 日温病由伏邪自內發出。 **鬱邪耗液故發而即渴其** ・・・・ ラー・ピノ コノ ニノ・

感之邪可知渴者熱從內發之證也仲景恐 禍不可言 一種明自少陰發出爲表裏也 温病 (即有發熱頭痛之太陽病也 首四九い軍士を呼ばる。 因伏氣條內。已申明咽痛下利為少陰 《特標是伏熱內發之温病也其少陰温 一般而無定處少陰之表質 不言脈以 太陽熱邪 、錯認為

氏之臆說非仲景之舊章、賴通自問跳出傷寒圈子 主之今檢傷寒論卻未見此數語使此語眞出仲景耶 論云太陽病但惡熱不惡寒而渴者名曰温病桂枝湯 謂非誤記也因喻氏嘗云仲景治温證凡用表藥皆 發之温病也 **亦當辨其簡誤若係吳氏誤記。尤不** 覺已入嘉言套中。又不甘爲人下。遂肆政原文 宗後發於不發之意尤在涇讀書記云此喻 知其誣聖誤世之罪。 一辩正余

若發汗已身灼熱者名曰風温風温為病 出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被工 友也、 張隱庵 可議處尙多。夢隱此書去其瑕而存其瑜乃鞠通之諍 一視失溲若 逆向引日再逆促命期。 **一被火者。徽發黃色劇則如驚癇。**

小便不 氣通於鼻而主皮毛風熱在表而睡息必鼾也夫心出而身重多眠也。楊云此證最易出汗故條中有自 **陽俱浮者。**風熱之 發汗,則陰液外泄風熱之邪更甚 而失溲矣足太陽之脈、 言肺主聲肺熱受傷故語言難出 消沮故為病如是焉若被妄下則愈亡陰液於後 和於前矣津液傷 **台系而出** 此因風熱過甚而陰 而身如燒灼也脈陰 全官失守。不能約 項律液內亡 也風熱傷氣故 国風温

參亦未連 促 必拘於名式 病。之加不極上家 時 4條身重多眠兩蹬 兩證脈相同也 則此條雖無 心須認定!

眠睡內風上 脈陰陽俱浮津液外泄白 傷津氣助其邪勢故身更灼熱因而勾起其肝風鼓蕩 似可從白虎湯擬法 外受風邪之證可見矣若被下者謂去 之陰而發旣經外發當清其熱乃誤發其汗反 太陽外感之 一つということととして 一鼓。而機竅窒塞故鼻息必鼾。語言難 風温其為病也虛陽外浮熱邪漫溢故

之虛風也然風温在肺、祗宜清解若誤以辛 之温風也此伏邪內發誤汗致逆者亦日風温乃內動 熾盛而瘈瘲皆敗壤之象也若止火熏之 雄按彼冬温春温之先犯手太陰者皆日風温乃吸受 外火助內熱震蒸而發黃劇則火邪擾心如驚癇肝 不利而直視失溲則氣亦脫矣如被汗下而被火攻 一芍延若既汗又下。而再逆之更促其命期也 是肺腎相關子母同病自汗出乃陰不內守。 温味運津等 汗多眠鼻鼾難語之變余治梁宜人 九七 遊尚可 案可

服桂枝湯、大汗出後、大煩渴不解、脈洪大者白虎加 熱邪。故白虎湯爲熱邪中暍之的方。專解內蒸之 湯遂至脈洪大大汗煩渴 條之危殆蓋桂枝。治自外人之風邪石膏。治自內發之 傷衛服湯後必微汗而解矣。 張路玉日 液 外越也未必盡是少陰 1此本温熱病誤認風 ヨハンノナノー 不解。若誤用麻黄必變如 知 經之證 此本温熱誤服桂 人熟非

雄按先曾祖云風寒爲病。 者必皆陰精已涸者也不然甯有不出者耶。 日少陰本寒標熱邪入其界。非温不散然温病之發寒 拙吾 變熱其欲出之勢有不待引之而自出者其不 未病誤用桂枝適足以 而熱反灼者。乃風温病温即熱之謂也後 · 精· 已被劫奪。更用辛熱是絕其本而資之脫也 金田品,西山村一六二一 傷寒表病而裏和者設温證邪從裏發 抑何固耶夫病本熱也 助邪而耗液蓋伏寒化 桂枝湯發汗 而愈若

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯吃 夏生薑湯日 枝之 煩渴而脈洪大連上條似論 **有汗之證從未見桂枝湯泊愈一** 內經風淫熟淫治以甘寒之旨也又醫林改錯謂發熱 黃芩湯乃温病之 **薑也蓋桂枝主在表風寒黃** 當用黃芩 **党船船** 第一 一證主以 人是亦温病也。 桂枝揚以黄芩易 風

次第也。 脇 邪 何 周禹載 **裹證傷寒協熱利必自傳經而入** 表也 漸次入 滿或頭痛或口苦引飲或 如傷寒台病皆表病也今不 以明言太少 **% たた、 校火** 品於四章於 外發未久內鬱已深其人中氣本 此則自內發外。無表何以知太少 、披猖嘔是 作利矣。 陽何不 (胡解) 悪寒而即熱故 用 不若此之 無表且有 之即利也 一處世 一陽。

證 今因由內發外。 邪雖 ベーミー・アンドン・ 見陽位 當 少陰之 欲眠睡。目合則 陰時。 與少陽相 則欲眠佝顯

雄按。 兩麥冬五 此 爲陽明經脈也 此條與發汗 錢知母枯蔞根白芍藥各 二陽合病之 徊 風 温 脈至治法 當條 擬用百合 間論必 万固 初 貫必連傷起通循級寒為

瘧者。肺素有熱而加外感為表寒裏熱之證緣陰氣內 虚不能與陽相爭。故不作寒也温瘧者。邪氣內藏少陰。 脈與證也彈瘧温瘧。 疼煩時嘔者

熱從少陰出外舍於腎之所合而上併 主春夏而始發爲伏氣外出之證寒蓄久而變熱故 个作寒也脈如平者病非外感故脈如其平時也骨 拙吾日此與內經論瘧文不同內經言其因此 明也白虎甘寒除熱 者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩 天が糸ろ 俱無寒但熱俱嘔而其因不 。桂枝則因勢而達之耳。 **内時個白**

惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反 寒論日陽明脈浮而緊 仲景伏氣熱病篇 一隔之屬正 「弦數者風發見多熱不已必至於極熱極熱則生 百四九、四二年 完了一 **丙經風淫於內治以甘寒之旨也** 飲食消息止其熾熱即來 而傳其熱於胃坐耗津液 一一之則胃中空虚客氣動 1111

從胃發且腹滿而喘種種皆陽明證也然咽燥非少 陽明熱病曷又爲脈反浮緊正以夏時肌腠本開人證耶不知陽明爲從出之途少陰其伏藏之地也夫 周禹載日浮緊傷寒 冬之寒脈也 風邪襲 《惡熱也又何以獨言陽明以夏時,徑熱上 八参湯区主 恒主之 、 致腠理反閉 而脈亦 無汗。故夏之 旣

緊脈去而浮在發熱引水 以白虎湯 邪是為合法若 其陰必至胃虚邪陷心中懊憹此皆 乎。觀舌上胎滑者則外邪何在以 小便不 因邪鬱旣深耗液 取乎白朮也 国四先い四十年を 、膀胱者。曷 利結於氣分熱病之 人参者以 飲り 便不利則其浮爲虛而熱 \ 解治而精液大傷也設使 「乾舌燥知其外邪亦」 四苓而主以豬苓耶 小便不利。由於血 **極** 阿膠補虛滑石 所熱。香豉 純

白虎加 禁也此 周禹載日渴而小便不利本 出復多。更耗其液津液曾幾更可下奪耶當以 其小便故也 與傷寒了 出多而渴者不可與豬苓燙以汗多胃中燥 。而五氣中。風與熱 八参去其熱則小便之 穀食在胃全賴津液 I A M SIG SIG SIGN 經誤治之 人脈。不 令溲數同意蓋汗 充足方能滑潤達了 津囘而自利矣 二出陽明二 FJ

致燥有一 見陰脈證 陰而軍 馬元儀日 氣損惟有白虎 甚 実 議 語 一轉側。口 **生**汗。手足逆冷若自汗出者 一不仁而面垢。臘

主以白虎湯雄族仲海垢也熟甚神昏則臟語 之汗故名自汗 所可治也 即所謂再逆促命期非

傷人名中熱此是外來之熟故曰中非即 周禹載日冬月有寒則能傷人 必病熱之熱也然而同用白虎者總以 在金所病在熱生金者土。 THE REPORT OF THE PERSON AS **亦曰中熱** 在少陰發出之 金生者水

之下。自有此悟也。雜族古人但以寒爲肅殺之於此有意立方。無心表異以干古之前 宣本上, 寒清絶矣前人有謂夏月宜補者乃補天元之眞氣。 是謂亡陰急當滋水之 而誤認為寒妄用熱劑則立危矣 何報之日汗大泄不止 又全不以 **補熱火也令人夏食寒是也** 徐润溪日。凡汗出多之病。無不惡寒者以 。失其清肅而壬水絕於巳癸水絕於午西北 伏氣之渇與今病ン 赤梁彩着 亡陽且令腎水竭絕。津液內 源三伏之義爲金受囚也金

時尚知暑暍之爲熱也金須知云熱死日暍是唐 者火之氣也故熱乃五氣之一。而熱病即傷寒有五之 與暍有異日寒往則暑來與寒對待非專言熱而何古 **喝之名更不知爲** 病或日暍是陽邪、暑是陰邪、土潤溽暑熱兼溼言也。 明之名,更不知為何病矣。雄族北齊書後主紀六月名暑追至隋唐後皆指溼熱為暑於是眞暑之名失 喝是也感烈日之氣而病。即素問寒暑燥溼風之 傷寒論以難經熱字。恐與下交温字相混故特指 稱暑喝热一 也若溼熱併至之病難經名日溼温

爲陰陽夫動靜惟人豈能使天上之暑氣隨人而判别 小寒大寒是暑即熱也寒即冷也暑爲陽氣寒爲陰氣 歧說偏多豈不可笑更有調停其說者强分動得靜得。 皆指烈日之氣而言也夏至後有小暑大暑冬至後有 太過炎暑流行蓋暑爲日氣其字從日。日炎暑日酷暑 乃天地間顯然易知之事並無深微難測之理而從來 平。况內經有陰居避暑之交武王有樾蔭暍人之事。仲 雄按內經云。在天爲熱。在地爲火,其性爲暑又云歲火 不察而好爲聚訟以紊道深文以晦道耶若謂暑必 白虎湯為熱病主方。同條共貫理益彰彰何後賢 || 沿卖系希另一

傷寒。脈浮滑。此表有熱裏有寒白虎湯 無定位。分旺四季。風溼寒溼無不可兼惟夏季之 原有溼也。 一盛故熱溼多於寒溼然暑字從日日為天 為地氣霄壤不同雖可合而爲病。究不可謂暑由 理詳本文脈浮滑不但無緊且復多滑乃陽氣甚 : 日世本作表有熱裏有 口經文寒字。當作邪字解亦熱也 一品九二里年长上 F 寒 必 係 傳 寫 之 八寒安得裏有寒者可

有熱也白虎湯主之則知此表裏一字爲錯誤可知當 魏念庭曰此裏尙爲經絡之裏非臟腑之裏也 爲上下更易 而爲亢害之證此表有寒也厥陰篇中。脈滑而厥者。裏 而鬱蒸此裏有熱也裏熱甚必格寒於外多厥逆身凉。 和校訂時。此節幸有寒字之誤不被摘出若見賜字。早 以反用石膏知母乎。表有熱即身熱也。上節止言病名。 沈堯封日。裏有寒之寒字乃喝字之誤如果裏有寒何 不言脈證此節詳言脈證出方主治兩節本是相承叔 摘置別論中矣程郊倩云暍病脈不浮不思傷寒論

雄按楊素園大令云此條寒字。諸家所雜未能妥帖徐 的是脶字之誤。 脈既滑矣。主以白虎湯則渴欲飲水可知是為熱痰凡 作痰字解。蓋痰本作淡會意一火搏水成痰也彼溼家。 干古隻眼,大本論無痰字。如溼家胸中有寒之寒字。亦 浮滑與難經熱病脈合則白虎的是熱病主方而寒字 之而滑。沈之散澀此是緊要處豈可模糊讀過本條脈 火微涇盛雖渴而不能飲是爲涇痰此暍病火盛鑠液。 君亞枝謂當作痰字解於義較協余謂徐君此解可稱 喝削難經之熱病也難經云熱病之脈陰陽俱浮浮 自山北江平岸上

傷寒脈滑而厥者裏有熱也 張兼善 痰因 清裏而除熱也。 張路玉日滑陽脈也故其厥爲 况暍家平。汪 反惡寒厥逆 脈王滑實 口水日寒無口拔靈素兩個 発糸糸 往有脣面爪甲俱靑者故宜 灰字 「虎湯 但

並用。以兩補之也 中和其背惡寒者則衞陽與腎陽並傷故 衞氣致背機惡寒故加入 眞水眞火是腎中之陰陽也氣血是營衞之陰陽也此 「燥渴心煩則暍熱內熾仍 江北江江岸之二一 加麥用可無疑若 有汗。故可用也 背惡寒而

用不可用耳。 參湯。但亦有中喝而外復傷風寒亦能令惡寒發熱脈 浮更當於有汗無汗上辨表證解不解以定此方之 沈堯封日此承上文。言煩渴背惡寒。固當用白虎如 吐下後七八日不解熟結本 熱無汗其表不解者不可與台 1虎加人参湯(三主之) 賭

皮中所致也。一物瓜蔕湯十三之 不陽中喝者。身熱疼重而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行 當遵之又沈亮宸云舌乾且燥謂視之無液也然則温 蓋寒傷形而不傷氣所以脈盛熱傷氣而不 皇甫士安旦脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之 雄妆 熱之審舌苔以祭津液,仲師已逗其倪矣。 裏所以表熱不除邪火內伏所以惡風大渴舌燥而恆 欲飲水不止安得不以生津解熱爲急耶 耶本文熟結在裏表裏俱熱! 一句已自酌量惟 御纂醫宗金鑑正誤篇時時惡風作時汗惡風

張路玉日此條言因熱傷冷之病。乃中暍之 追飲之過多。或得之冷水澡洗暑反入內也 朱奉議[万中行曰夏日則飮水人之常事而曰傷。何哉良 也夏月自汗惡寒身熱 夏月發熱惡寒頭痛身體肢節痛重其脈洪 其肺金則用白虎加人參湯以 喜涼惡熱也惡難發熱而仍惡 而渴其脈微弱者。 也丙

若發汗,則惡寒甚加温針則發熱甚數下之則淋甚。 太陽中喝者發熱惡寒。身重而疼痛其脈弦細芤遲小便 」選選然毛聳手足逆冷小有勞身卽熱口開前板齒燥 藿香正氣九等辛温燥烈以重劫其陰液乎東短津枯之候雖身重惡寒豈可再投清暑益氣湯及賜即發也口開前板齒燥者裏有熱也可見其質 者。太陽經氣不足也小有勞身即熱者。謂勞動其陽而 表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者。表中賜也脈弦 成聊攝日病有在表者有在裏者有表裏俱病者此則 形之淫傷於肺金則用瓜帶湯救之各有所主也 細芤遲者。中暑脈虛也小便已灑灑然毛聳手足逆冷 且此。坚卑以

按之來而緩時 傷寒。脈結代心動悸者炙甘草湯十三之一 虚故惡寒甚若以温針助陽則火熱內攻故發熱甚若 沈堯封日此言精氣素虧而中暍者。 喘喝不止故前板齒燥若發汗以去表邪則陽氣 數中有還者反動名曰結陰也脈來動而中止 人不淺內經云因於暑汗煩則喘喝口開謂喘喝也言貽誤 未立方而甘凉撤熱存津之當用已除裏熟則內虛而膀胱燥故淋甚雄 氏方氏主用白虎加人參湯殆從 未立方而甘凉撤熱存津之當用。 八字系系六十 止復來者名曰結又脈來動而中止 名復脈湯脈

散主弱不能遺發而反自徬徨也復脈乃核實義之名。 然則是湯也必欲使虛者加進而馴至於實則實者自 宜先建中、汗則津越下則津空津耗脈細不可妄攻。 骸津多脈盛津少脈衰津結病至津竭禍來脈見微弱。 退散而還復於元之義也 方中行日脈結代而心動悸者虛多質少譬如寇欲退 俚句以明其義胃藏津液水穀之海內充臟腑外灌形 喻嘉言曰。脈者。氣血之先,仲景於津液內亡之脈名之 結陰代陰、又名無陽原有至理何可不知即爲四言 一五七八四十十八十二

陽陰精所裁胃中眞陽津液所胎陰枯津盛例泉可溉 陽脈奪經揭無陽津液欲竭較彼亡陽天 血無方治。此未必即是前節主方。然觀方中藥叉甯必 陰精衰薄。餅罄罌哀何謂結陰無陽脈闔何謂代陰無 沿前證。 實利用調承驅熱存津此法若神腎中 論精氣素虧而感微邪之治前節有脈證 教焚心

浮爲 * 仲景溼温篇 一般是謂氣衞氣卽津液也故在外之 言衞氣也即言律液也。 小能作汗。在內亡津液則口 园先红草彩 焦出氣宣五穀味熏膚充身。澤毛若霧 上暑熱傷津見 其小便。 知也津液爲陽人之 液乾 少則

此稍異 獨存卷首耶難經云潛温之脈陽濡而弱陰小而急與 也故涇爲五氣之一。涇温乃傷寒有五之一。編傷寒者。 經之經温證也素問在天爲溼在地爲土壓乃土之氣 仲景於太陽論中。五證並列挨次剖析。此論經與即難 以溼暍為非傷寒置之别論然則中風亦非傷寒何以 難經傷寒有五郎素問寒暑燥淫風之五氣爲病也故 叉日傷寒。既以頭痛胃實等項。分六經即以汗字判 傷寒論原序云撰 ツーラ が糸分二 禁小便不利認溼氣縱橫辨别邪無遁 風

逕家之爲病。 傳寒中、朮附湯主之 蓋既溼勝,則次傳寒中。小便自利者。有之 勝者黃而晦宜茵陳五苓散主之海藏以盡黃為陰黃 倪沖之傷寒彙言此溼家為病之總綱也雖蓋體氣 沈堯封日,丹溪云如造麴然溼 **熏黄與橘子黃同是溼熟彼以熱勝者黃而明此以溼** 而疼故日痹今一身盡疼而表有熱故聊攝稱口 以溼為事者是為溼家辨其痛與痺痛不同。溼在關節 温跳座革命一 身盡疼發熱身色如熏黃 等著實處留心。

得水而不能飲則口燥煩也。 溼家其人但頭汗出背强欲得被覆向火若下之早,則噦 **残土敗而色外越之痿黄皆與暴病不同不可概目爲** 溼熱病矣 尤在涇曰寒溼居表陽氣不得外通而但上越爲頭汗 便濟氣虛之陰黃身面浮腫睛白能餐勞倦之弱黃神 志不足猝受恐嚇膽氣外泄之 爲期其餘所因甚多有穀疸酒疸女勞疸黃汗。及冷汗。 雄按溼熱發黃名日黃疸皆是暴病,故仲景以十八 小利舌上 いていますれる。 | 如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲 2驚黃肝木橫肆。脾胃傷

焦之陽 隨其所傷之 攻法以逐溼乃反 有寒而復 始其津液 按胸中 雖渴而不能飲 而寒溼 津液燥聚如胎之狀實非胎 有寒之 仍聚於上 日山北バア山岩子(ラニ 不能飲則 布而胸中 處而爲病也舌 寒字。當作痰字 滿或下 口舌燥煩 言胸 則陽更被 中此 口燥 焦之陽不化 田 一如胎者 也畫 用温薬ご 有熱而渴 而津液乃聚耳。 解胸中 明確 机。 痰飲 而嗷! 下後陽氣 非胃熱 通 欲得 有痰故舌 乃作矣或 而 陽不 益哪 疑 胸 陷

死。 亦通 熱蘊積成質未可遽用下法格可妄下額汗出微喘陽熱蘊積成質未可遽用下法楊云溼證額汗出微喘陽 雄按張石碩云自此而推之雖額汗出微喘若大小便 決。故死。一 已離而上行。小便利。下利不 **小利者是陰氣未脫而陽之根猶在也下雖大小便利。** 額上汗出微喘小便利者死若下利不止 無汗。不喘是陽氣不越而陰之根猶在也則非 沿帝紀和元 作小便不利者死謂陽上浮而陰不下濟也 溼病在表者宜汗出裏者宜利小便苟非溼 止陰復決而下走陰陽離

傷寒論桂枝湯下語亦可互參必分其汗又欲令其多耶此與 出者。但風氣去淫氣在是故不愈也若治風溼者發其 但微微似欲汗出者。風溼俱去也有節度如此奈何近 醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗。汗 汗者死 喘逆陽氣上脫之候亦死亦有下利不止小便反閉而 額上汗出者謂之 L 風 溼 相 搏。 可以隨其虛實而救之。至於下利不止雖無頭汗 傷寒彙言。溼家不惟不可誤下。亦不可誤汗。惟 The transfer of 身盡疼痛、法當汗出而解。值天陰雨 之關經云關格不通頭無汗者可活

伏而存留是故不愈也就使之微微似欲汗出則正 宣發充身澤毛若霧露之灌溉與病相應斯正 時值淫雨隱 風之乘鏬也速溼之侵人也漸緊然風在外而溼在內 風溼相搏 邪氣卻營衞和而風溼並解矣。思 汗。而病不愈不惟風溼之邪不解而且傷眞氣矣。防况 大汗出而漬衣被汗轉爲溼風氣雖去而溼氣仍隱 以治風溼者必通其陽氣調其 (温熱殺稱卷) 證佛風從前來經傷卑下。兩至搏擊。 不免溼氣盛行。統醫云此可發汗。若發大

能飲食腹中和。無病病在頭中寒溼故鼻寒內藥鼻中 溼家病身疼痛發熱面黃而喘頭量鼻塞而煩其脈 濁者黏滯故汗法。大有區别也 風寒不同者雖寒溼同爲陰邪而寒淸溼濁。清者易散。 邪未有不去者若大發其汗。陽氣奔騰風爲陽邪隨氣 使陰陽表裏之氣同流則其因 而泄溼邪陰滯故反遺留而病不愈也此治風溼與治 而去表溼隨營衞流行。化徵汗而解。陰壓之邪旣解風 A . 1740 mail 1 mail at at. 座門 三焦氣化由小便 : . 1 |陽經脈

竅於鼻而行氣於皮毛邪從鼻人 納鼻中。如近世之迹藥。雄按 迥 面黃氣閉則喘氣壅則頭痛鼻塞而煩皆肺氣窒寒 行於身表。頭中寒溼則表氣了 下降。故脈反大,其與淫中於下。而在陰之脈沈細 和無病。 同也肺通喉胃通咽邪在肺了 頭中寒溼故 則愈 溼遏其陽而上 不在胃故自能飲食 宣故身疼發熱肺 則

表解之。 沈堯封日。栀檗湯清熱利小便治溼熱之 記兆四年安二

內。但當利小便句。亦無著落。 尤在涇日。此則熱結在裏之證也身黃如橋子 極若以麻連小豆湯爲主方不惟栀檗湯無著落。 小便不利。腹滿故宜茵陳蒿湯、下熱通瘀爲主也。 乙方。惟外兼風寒者宜之栀檗湯利小便之方也 而明為熱黃也若陰黃則色黃而晦矣熱結在裏為 而還小便不 八日。身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿 心無系統分 此為熟越不能發黃也但頭汗出身無

陽明病面合赤色不可攻之。攻之必發熱色黃小便不 熱之蓄於內者方城而溼之引於外者無已淫與熱 從小便出也 得外達。小便不利則熱不得下泄而又渴飲水漿則其 安能發黃哉若但頭汗出而身無汗。劑頭而還則熱 解則必蒸發為黃矣茵陳蒿湯苦寒通 」此是寒邪外束之 一日中北江日本 4天)溼温證也麻連

١

陽明病無汗。 章虛谷日 高 證 。 從內走與水穀之 熱鬱在經當以汗解若攻之 中懊憹與胃中水液鬱蒸而身必發黃也。 章虚谷口 也 方。除卻惡寒。即是栀檗 口雖未誤下。而無汗。小便不利。 1日書最新名 小便 一明發黃之 「氣變素蒸發黃 一證此又明致黃之由也面赤者 不證更加腹微滿即是茵陳 傷其腑氣則在經之熱反 二焦閉塞而小便不

發熱頭痛項强頭攣腰痛脛痠所謂陽中霧露之 喻嘉言 安能免乎。 額雖微汗。而周身之汗,與小便愈不可得矣發黃之 口脈陰陽俱緊者。法當清邪中于上 表氣微虛裏氣不守的使邪中于陰也陽中于邪必 **嬰氣微急三焦相** 濁邪中下。陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表 子はもならからとい 「潔也。濁邪中下。名曰渾也。陰中于 山陰陳坤載安注 溷內外

爛 此 作使遊于經絡出 孤弱五液注下下焦不闔清便下重今便數難臍 命將難全 者陽氣厥微陰無所使客氣入內嚔而出之聲唱 節。言受疫之 [陰中陽中者亦即邪之中] 血炭不流若 相逐為熱所擁血凝自下、狀如豚肝。陰陽俱厥 三焦相溷其日中上 中焦不治胃氣上 沿淮龙 衛氣前通者。小便亦黃與熱相其 人藏府熱氣所過則為难膿若陰氣 一衝。脾氣不 一中下者是就邪之淸濁 小轉。胃中爲濁。 निर्व 咽

其漸恢也小 難治。 下解。倘 前通者邪可從 將難全矣爲癰膿下 一日 してきる ことに マン・・・ 是其候也恆模糊 所以疫證最怕邪伏募原內壅不潰 氣 邪必內陷傷臟五液注下。 咽中則傷若 漸其 大 大脈·凍

危稅。 發黃若熨之。則咽燥若小便利者可救之小便難者為 出喉痛 傷寒同而漸小漸大之厥脈是疫之所異也因 穀陽邪多則便膿血熏之則溼熱鬱蒸而身黃熨之 則雨 節言疫邪初起 因內熱而下之則陽氣內陷 正氣不得宣通所以先必惡寒而甚則又形熱狀汗 目亦也若因惡寒而發汗則助熱上蒸而咽傷 目閉寒多者。便清、穀熱多者。便膿血若熏之 本紹維名 《總因邪伏募原故汗 (證與脈也陰陽俱緊惡寒發熱與 而目閉陰邪多 則便清 邪氣深 河

便心腹滿下之 寒發熱頭痛微 此節言清邪之中上 人募原也其發熱頭痛微汗。為邪 1日北江军皇长111 則短氣小便難頭痛背强加温針則衂 一者故陽分之證居多。清邪中一 治氣 難頭痛背强者 汗馬 小識 邪蔽清陽熏之心液過汗熏之 則熱

不嗜食大便 頭 假 虚役 脈 痛 火火火 令手 目黃者若下。 比則邪 頭 則 兩 重 象儿 則

病 非 也。 無表裏證發熱し 不嗜食 虚故非偏陰偏陽可治。 仍從募原 口熱則消穀 LYTTIGHT A.A. 山諸證此 中 便完穀小便自 此陰實 氣出頭痛 **(在謂陰邪歸陰也邪併於陰** 日。雖 政陰 善飢 脈浮數者。 日閉。 蓟 ì 多濁 可 可制貪水 嚶。咽 假 中 則

而不從汗解,其內熱已深故日可下。此指見在而言假 令已下。 是指下後 言也若下後 脈數不 言脈數者。熱盛於內也浮者。熱蒸於外也發熱七八 **無前通也官** 下利便膿血者。已成脾氣孤絕五液往下。為不治之 陽應以汗解之。反以冷水選之若灌之其熟被卻 設善飢為衞氣前通也熱傳於陰必傷血成於為營 一変邪之 **勿作尋常協熱利看。** 类益煩。 肉上 分傳者。病無表裏證邪在募原此指初起 抵當場即下如脈肝之類若脈數子 林浴林 一粟起意欲飲水反不渴者。服文 不解熱傳於陽則 解。而

無熱證者與三物小陷 灌溉也沒邪熱極原可飲冷水得大汗而解者乃以之 更益煩卻字似非誤楊云是文蛤散當屬文蛤湯抑不得外出轉而內攻故彌文蛤散當屬文蛤湯 **濮灌皮毛內熱被冷水外劫。故內煩益甚肉上粟起也** 在陽者謂疫邪已傳陽分也傳於陽當從汗解選噴也 欲飲而不渴者內熱爲外水所制也文蛤性寒氣燥合 功。小陷胸湯及亦可服七字疑行。 授編 且此。空岸经 古去外水而清內熱五苓散亦具利水徹熱 卻字。疑是劫字 胸湯 亦可服。 熱被冷不

傷寒、噦而腹滿視其前後、知何部不利利之則愈 後必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者處 得病六七日。脈遲浮弱惡風寒,手足温醫二二下之不能 而脇下滿痛面目及身黃頸項强小便難者與柴胡湯 利 腹滿前後不利可據其為邪氣壅蔽無疑前後二便也 非表虛也手足温而脈遲非裏寒也合之爲疫邪內 此疫が之越於三陽者得病六七日惡風寒而脈浮弱 此疫邪之傳裏者噦在傷寒多寒在疫證爲熱况見有 不潰之證醫者。重於疏裏乃二三下之不能食小便 一便即疏裏法也 へ記書が分子

公氣邊工 陽病未解脈陰陽俱停先必振慄汗出而解。但陽脈微 先汗出而解。但陰脈微者下之而解若欲下之宜調冒 穀者噦亦屬邪蔽使然非內寒也末句之義似有脫簡 項强太陽也邪口 渴後嘔爲水飲內停。非少陽喜嘔柴胡湯必不可與食 陽與柴胡湯參甘薑棗錮蔽疫邪必下重作利也若先 按經據證略加引經達表之藥足矣若拘於脇痛為 一越於太陽者太陽病不解係疫邪浮越非 /北北北江上下江 亡越於三陽斯時但於清解熱毒劑 一陽也面目及身黃陽明也 A HIT

後下之 太陽病下之而不愈因復發汗。以此表裏俱虛其人因致 從下解汗法不一而下法宜調胃承氣以疫邪雖熱。 此言疫邪傳表先下後汗之 也脈微調邪氣衰也陽邪先退先從汗解陰邪先退 必虚實也 陽經病也停勻也脈陰陽俱停是尺寸浮沈遲速 同等也其正氣有權足以化邪故從汗解振慄者戰汗 自家汗出自愈所以然者。汗出表和故也得裏未和然 **萧** 斜 斜 为 虚其裏故不愈因復發云 一誤疫邪達表當從汗解

太陽病下之。其脈促不結胸者。此爲欲解也脈浮者必結 也脈緊者必咽痛。脈弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛 當從表一誤下之其變有不可勝言者促爲陽盛下上 證汗後往往有宜下者有下後必汗出而始解者總由 邪氣分傳而無一 虚其表故汗出而作冒也必俟表氣了 此言疫邪誤下之 必致結胸不結者。陽邪外散也爲欲解浮爲在表 脈沈緊者必欲嘔脈沈滑者協熱利脈浮滑者必下 温此四阜分 定之治法也 一變治疫雖宜疏裏但既越於太陽自 和再和裏氣疫

陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治 七日不可治升麻鼈甲湯五十王之 也下之 其飲故欲嘔沈滑者熱爲溼滯也下之則溼熱下流故 故編體斑斑如錦紋也咽喉痛堙膿血皆邪熱鑠津 挾風下之則引風入肝。故兩脇拘急細數者。熟鬱於內 陽毒者疫邪犯於陽分也陽邪上建故面赤熱極傷血 協熱利浮滑者熱盛於表也下之則熱邪內攻故下 則內陷為結胸緊為邪實下之則邪上浮為咽痛弦者 **山時腐敗之勢五日經氣未周毒猶未徧故可治七** (則邪火上衝故頭痛未止沈緊多飲下之必動 八七青八条千十二

陰毒之爲病,面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七 不可治升麻鼈甲湯去雄黄蜀椒主之。 陰毒者疫邪人於陰分也陰中於邪故面目靑邪閉經 數與陽經同而治法原方去雄黃蜀椒者陰分已受熱 絡故身痛如被杖咽喉痛者。陰分熱毒上壅也故其日 所以解陽分之毒。即所以救陰分之血也 雄按王安道云陰者非陰寒之病乃感天地惡毒異氣 則邪氣徧而正氣消矣故曰不可治方用升麻鼈甲者。 八於陰經故日陰毒耳後人謂陰寒極盛稱爲陰毒引 不堪再用熱藥也 一一一一一一一一

成非天地惡毒異無所中也又趙養葵云此陰陽 散正陽散等藥竊謂陰寒極盛之證固可名爲陰毒然 毒理或有之。至蜀椒豈面赤發斑咽痛唾血所可試乎。 終非仲景所以立名之本意後人所敘陰毒與仲景所 仲景所敘面目青身痛如被杖咽喉痛數語卻用附子 陽從陽欲其速散也余謂。雄黃尙屬解毒之品用之 生冷或暴寒所中。或過服寒凉藥。或內外俱傷於寒而 紋陰毒自是兩般豈可混論蓋後人所敍陰毒是內傷 叉按雄黃蜀椒二物用治陽毒解者謂毒邪在陽分以 是感天地疫癘非常之氣沿家傳染所謂時疫也。

也事 湯陰毒但無雄黃蜀椒此坊刻之譌本也宋 未深勘至於陽毒陰毒 又按倪沖之 毒陽毒概用全方陰毒不去椒黄於理稍近余於萬歴 且耗痰精髓逆亂氣血所以猝受山林水澤瘴厲惡 八經諸條其中文義前後起止多有關失極代醫哲並 一亥得南陽舊本其陰毒係於去雄黃下。作倍蜀椒 これを記書えて 可曲爲之說世 蓋陽毒陰毒 言附載袁雲龍云仲景之 一條更可詫異俱用升 刀麻鼈

者。 班 有者。 罕能救細按一 肵 陰壽時醫按法 有鎖喉風纏 閩 有氣喘急促者有發譫語煩亂者雖有兼 咽 有面色青而悽慘者有吐膿血喉風纏喉風鐵蛾纏三證其狀 理豈非陽毒 黔甸。以及交阯之 而成疾余當壯年。 證俱有咽喉痛三字以余竊 苦猝發之 白死余見此一 間二五日可治至上 驗中州等處有人 版血者。有身痛如被 式狀相似有面色赤紅 類乎,再察其脈緩 論瘍科 **八** 患此 如此

以余度之陽毒即後世之爛喉沙耳。叔和謂之温毒是 以蜀椒施之陽邪終嫌未安改從喉科法引吐却穩當。 陽毒爲陽邪陰毒爲陰邪矣。陰邪固宜倍蜀椒之半。 用離餅探入喉中。吐痰椀許。活者百數據袁公之論 百合病者。 治法忌用温散宜用清化。陳繼宣疫抄草專論此證 では、江本学 達砂一 个能臥欲行不能行飲食或有美時或有 - 日乃愈若溺時。頭不痛。淅淅然者。四十 百脈 如有神靈者。身形如和其 一銭火硝六分米醋 宗悉致其病也意欲食復不能食

最金 病 如 施楊云 清正氣因乏不能流暢如人在雲霧之 而肺 H 合病者皆緣時疫新愈其三 月被蝕之後或明或暗故有種種不可名言之 完此 善證 朝百脈。 出。或 配治不能 小便赤脈微數乃餘熱的證也病不 但頭取者。 いるががから 便由於氣化水去則火上 宗者統宗於 日或一 補 **潟温凉惟以清氣爲主氣歸** 日愈其證或未病 月微見者各隨證治之。楊 一焦腠理榮衞之交餘熱 即 悉致其病之 中。條清條渾。 而預見或

腑氣 名病也。 等證也百合法 頭痛諸證而言。日 热逗留肺經之 維按此病仲景以百合主治即以百合名其病其實 台功專清肺。故以 上魄魄不 一熱漸衰病漸輕故愈日漸速也 空表氣亦因之而失護也但頭取者陽氣不 日息月 11. 在八匹 早 12. **乃再周而陰必復也** 一證凡温暑 「未病預見謂未成百合病先見頭痛 經熱諸病後皆有之不必疫 一搦時祈 百合。即以百 其證指풺時 能

在肺 人之 此 攻陰復發 處 推究致百 役 士陰者 余詢 蘭 溪論 悟 在嚴州舟次見 以陽法救之見于陽者以陰法救之 外可矣謂 當知 起於時證之 調則陰 源見於陰者即陰中 絲瓜子冬瓜皮知 服之。 見陰攻陽乃復 劑 愈 规。 阿 所 劑 好世 母為方。汪按 於邪也 證其父 此亦 毋 無

白合病發汗 陽復 也 通 但就営 見陰攻陰云 所以致有百合之病。若於百合病中。並無汗 後者其陽分之津液必傷餘熱留連而 陰百合同 -後者百合知毋湯 一九八日十十八人 **橋講不說到氣血臟腑上。** 下之法也下之汗 是為見陽攻陽 者均之為逆皆因治不 知母泉水以清其餘熟而陽邪自 節 吐下。皆此意此處陰陽 知攻陽救陰復下之 如法陰陽未能 不攻陰救

日合病吐之後者百合雞子黃 合城下之後者百合滑石代赭湯八 其得之於下後者下多傷陰陰虛則陽往乘之 百合以調和心脈是亦用陰和陽矣。 **卜焦之熟象百合湯內加滑石代赭取其鎭逆** 其得之吐後者吐從上 一乘清竅爲之蒙蔽矣故以雞子黃之純陰養血者佐 陽也是謂用陽和陰法 中国ネネスコー 一逆較發汗更傷元氣陰火 十主之。

百合病變發熱者百合滑石散仁主之 百合病。沿不差者栝婁牡蠣散 退熱加滑石以利竅通陽日 行不使上鑠也此注已極該括時 雄按尤在涇 從小便去也 而津液傷也。枯婁根苦寒生津止 發熱者餘 為病狀如傷寒 · 括婁吳、皆美。 三百合洗方面 四日病變成渴與百合洗方面 三三之 邪鬱人淫 默默欲眠目不得閉臥 不欲飲食惡聞食自 當微利指 陳注較遜故從尤本。 城寒引熱下 條 於 條 重 證

幽陰者 下部則咽戟苦參湯洗之蝕于肛者雄黃熏之 不安。面目乍赤。 **%雄黃皆燥溼殺蟲之 【品此心型音中公二一** 傷寒。內熱故默默欲眠。內煩故目不得閉 作赤 作黑作 於此也聲哽因知其蝕於喉咽乾而宜加餘邪二字、喉與一陰爲津液 、熱鬱於下。津液不 機者狐盛病是餘毒停積 不外溼熱久留 能上升也餘熱 **"隱見不常非蟲** 昌 小散積

三十二主之。 赤如鳩眼七八日。目四眥黑若能食膿巳成。赤豆當歸散 赤如鳩眼七八日。目四眥黑若能食膿巳成。赤豆當歸散 歸。和血 熱傷血分也七 之證初得之汗出表氣尚通也至三 此疫邪熱毒。蘊伏於內也故有脈數 而溼熱自化抑亦苦辛雜 在胸腹膿成於 膿使毒從下解也。 アイドイン 八日。目四皆黑血已腐敗也能食者 脈篇中清邪中上 小豆清熱去座兼 **焦**濁 四日。目赤 邪中下焦 四也。此略氏多 **巡煩欲臥** 如鳩眼。

穢爲第一義。上焦如霧升而逐之,兼以解毒中焦如温 者均歸之疫雄按守眞論温鳳逵論暑叉可論疫旨。但將傷寒金匱中證治與風寒等法不合寓有毒意 利霍亂等不過感一時冷熱之氣者。循且論及而謂疫 病之爲流行大毒者。反不之及耶然則傷寒論中之必 論識超千古高出千古直發前人所未發盡仲景於吐論鐵超千古雄拔林北海亦云喻氏論疫盡仲景於吐 楊按此篇搜輯甚佳。俱古人 **有疫證是非臆說坤、學識淺陋不敢妄自搜羅擾亂經** 疏而逐之兼以解毒下焦如濱決而逐之兼以解毒。 **飢為仲景論疫根據可謂獨具隻眼者矣其治法以** 自业 先公司上音子会公丁 八所未及然原論不可解處 是一

温熱			不是	於其	甚多
棉卷二			無書也	不可解者	其用方與
	i			勿强事穿	甚多其用方與病不相登對處亦有之讀
				鑿則善矣。	對處亦有
				此方不為	*
				昔女外外如	其意